

BORZINC GOLDEN

UYGULAMA ŞEKLİ :

Kullanılacak miktar kadar GOLDEN BORZINC sıvı bir kapta suya erdilir, iyice karıştırılır ve daha sonra ana tanka ilave edilir. Her türde suda mücadele ilacı ile kullanılabilir.

Garanti edilen içerik (µg/w)

Suda Çözünür Bor (B) : 80,30
Suda Çözünür Çinko (Zn) : 85

UYGULAMA MİKTARI :

- * Kullanmadan önce pipeti iyice çalkalayınız.
- * Çocuklardan uzak tutunuz.
- * Sigara içmeyiniz.
- * Herhangi bir peyvilyip işlemeyiniz.
- * Gözük ve eldiven kullanınız.
- * Teneffüs etmeyiniz, yutmayınız.
- * Yutulmuş halinde medikal tedaviler alınız.
- * Göze ve deriye bularsa bol su ile yıkayınız.
- * Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- * Aşağı uygun doz oranını almayınız.

+4, +45 C arasındaki normal depolama şartlarındaki imal tarihinden itibaren özelliklerini 3 yıl korur.

NET MİKARI : 1kg

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
2007		2008		2009		2010					



Son kullanma tarihi imal tarihinden itibaren 3 yıldır

EC FERTİLİZER

Bor (B) Çinko (Zn-Sülfat) Sıvı Mikro Bitki Besin Maddeleri



GETA ALTERNATİF ENERJİ SİSTEMLERİ
TARIM PETROL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Özgürlük mah. Meriçoç Gıda Topancılar Sitesi D Blok
No:82 MERSİN
Tel & Faks: 0324 2340963

ÜRÜN ADI	KULLANIM ZAMANI	DOZ / DEKAR	
		Topraktan	Yapraktan
Mandalina	Fidanlarda	500 cc	100 cc
Portakal Limon	Meyve tutmuş ağaçlar	750 cc	120 cc
Greyfurt Elma	Maksimum ürünü ağaçlar	1000 cc	200 cc
Kiraz Ayva Armut	Dama sulama yöntemi ile	1000 cc	
Vişne Şeftali Kayısı	Çiçek öncesi dönemde 1. uygulama ve 15 gün aralıkları 2. uygulama yapılır		150 cc
Fındık Ceviz Nar Zeytin			
Uzum	Fidanlarda	600 cc	80 cc
	Orta boy fidanlarda	800-900 cc	120 cc
	Maksimum ürünü ağaçlarda	1200 cc	150 cc
Domates Hiyar Biber Dolma Biber Patlıcan Kabağ ve Diğer Sebzeler	Çiçeklenmeden önce 1. uygulama ve hasat sonuna kadar 15 gün aralıkları uygulamaya devam edilir	500-700 cc	120-150 cc
Pamuk	Dama sulama yöntemi ile		
Nohut Mercimek Bezelye Bakla Fasulye Bamya	Bitki boyu 10-15 cm olunca ilk uygulama yapılır.		120 cc
	İlaçlama ile birlikte 1. uygulama, tarak olgununda 2. uygulama, ilk kocalar olgunlaşmaya başlayınca 3. uygulama yapılır.		
	Demir eksikliği görüldüğünde, Yapraklar oluktuktan sonra 15 gün 2. uygulama yapılır.		100 cc
Şeker Pancarı Patates Soğan Sarımsak Turp Havuç	Birinci etapda ilk uygulama ve 15 gün sonra 2. uygulama yapılır.		150 cc



LİSANS NO : 846 TESCİL NO :

PIYASAYA SUNACAĞIMIZ ÜRÜN ÜZERİNDEKİ ETİKET BİLGİLERİN AYNISI OLACAĞINI TAAHHÜT EDER, AKSİNİN TESPİTİ HALİNDE 4703 SAYILI KANUNA GÖRE HAKKIMIZDA YAPILACAK CEZAI İŞLEMİ KABUL ETTİĞİMİZİ BEYAN EDERİZ.

GETA ALTERNATİF ENERJİ SİSTEMLERİ
TARIM PETROL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Özgürlük mah. Meriçoç Gıda Topancılar Sitesi D Blok No: 82
Tel: 0324 234 09 63 Adresiz / MERSİN
Lüman V.D. 361010 5278